

## 小児用量換算表

オキサトミド<sup>®</sup>ドライシロップ小児用2%「タイヨー」

〈換算表〉投与量はドライシロップとしての量(g)を示す

年齢 目安 (才)	体重 (kg)	× 2		年齢 目安 (才)	体重 (kg)	× 2	
		1回投与量 〔最高用量〕 (g)	1日投与量 〔最高用量〕 (g)			1回投与量 〔最高用量〕 (g)	1日投与量 〔最高用量〕 (g)
1	10	0.25 [0.37]	0.50 [0.74]	7	23	0.58 [0.86]	1.16 [1.72]
	11	0.28 [0.41]	0.56 [0.82]		24	0.60 [0.90]	1.20 [1.80]
2	12	0.30 [0.45]	0.60 [0.90]	25	0.63 [0.93]	1.26 [1.86]	
	13	0.33 [0.48]	0.66 [0.96]	26	0.65 [0.97]	1.30 [1.94]	
3	14	0.35 [0.52]	0.70 [1.04]	8	27	0.68 [1.01]	1.36 [2.02]
	15	0.38 [0.56]	0.76 [1.12]		28	0.70 [1.05]	1.40 [2.10]
4	16	0.40 [0.60]	0.80 [1.20]	29	0.73 [1.08]	1.46 [2.16]	
	17	0.43 [0.63]	0.86 [1.26]	30	0.75 [1.12]	1.50 [2.24]	
	18	0.45 [0.67]	0.90 [1.34]	9	31	0.78 [1.16]	1.56 [2.32]
5	19	0.48 [0.71]	0.96 [1.42]		32	0.80 [1.20]	1.60 [2.40]
	20	0.50 [0.75]	1.00 [1.50]	33	0.83 [1.23]	1.66 [2.46]	
6	21	0.53 [0.78]	1.06 [1.56]	10	34	0.85 [1.27]	1.70 [2.54]
	22	0.55 [0.82]	1.10 [1.64]				

〈成分分量〉 1g中:オキサトミド 20mg

〈性状〉 白色の細粒

〈効能効果〉 気管支喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、痒疹

〈用法用量〉 通常、小児には1回オキサトミドとして0.5mg/kg(ドライシロップとして25mg/kg)を用時水で懸濁して、朝及び就寝前の1日2回経口投与する。  
 なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、1回最高用量はオキサトミドとして0.75mg/kg(ドライシロップとして37.5mg/kg)を限度とする。

お問合せ先:テバ製薬DIセンター

TEL:0120-923-093 FAX:052-459-2853