

お薬をお飲みになる前に

- 肝臓の病気にかかったことがある
 - 肝臓の検査値に異常があるといわれたことがある
 - お薬でアレルギーを起こしたことがある
- などがあれば医師や薬剤師にお伝えください。

お飲みになってからは

お薬を飲んでいる期間中は定期的に肝機能検査を受けましょう

ご自分の判断でお薬を飲んだり飲まなかったりするのはやめましょう。また、飲み忘れても後からまとめて飲むのはおやめください。

わからないことがありましたら、医師または薬剤師におたずねください。




病医院・薬局名

ウロリープ錠50をお飲みになる方へ

お飲みになる前に必ずお読みください

ウロリープ錠 50



(拡大率 200%)

(原寸大)

ウロリープ錠 50 は、血液中の尿酸を尿中に排出させて痛風・高尿酸血症を改善するお薬です。しかし、患者さんによっては、このお薬の服用中に肝臓の働きが低下することがあり、主に投与開始 6 ヶ月以内に多く認められています。

お薬をお飲みになる前に

- 肝臓の病気にかかったことがある
 - 肝臓の検査値に異常があるといわれたことがある
 - お薬でアレルギーを起こしたことがある
- などがあれば医師や薬剤師にお伝えください。

お飲みになってからは

お薬を飲んでいる期間中は定期的に肝機能検査を受けましょう

ご自分の判断でお薬を飲んだり飲まなかったりするのはやめましょう。また、飲み忘れても後からまとめて飲むのはおやめください。


わからないことがありましたら、医師または薬剤師におたずねください。



病医院・薬局名

ウロリープ錠50をお飲みになる方へ

ウロリープ錠 50



(拡大率 200%)

ウロリープ錠 50 は、血液中の尿酸を尿中に排出させて痛風・高尿酸血症を改善するお薬です。しかし、患者さんによっては、このお薬の服用中に肝臓の働きが低下することがあり、主に投与開始 6 ヶ月以内に多く認められています。

自分でできる 肝機能のチェックポイント

肝臓の働きが低下したときには、下記のような症状がよく見られます。

お薬を飲んでいる期間中は定期的に肝機能検査を受けましょう。

● 食欲がなくなったり、体がだるくなった（けんたい感）と感じる

● 尿の色が濃く（茶色く）なる

● 発疹がでる

● 皮膚や白目が黄色くなる（黄疸）

● 体がかゆくなる

その他に、吐き気、下痢、発熱などが見られることもあります。

このような症状に気がついたときには、いったん飲むのをやめて、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

自分でできる 肝機能のチェックポイント

肝臓の働きが低下したときには、下記のような症状がよく見られます。

お薬を飲んでいる期間中は定期的に肝機能検査を受けましょう。

● 食欲がなくなったり、体がだるくなった（けんたい感）と感じる

● 尿の色が濃く（茶色く）なる

● 発疹がでる

● 皮膚や白目が黄色くなる（黄疸）

● 体がかゆくなる

その他に、吐き気、下痢、発熱などが見られることもあります。

このような症状に気がついたときには、いったん飲むのをやめて、すぐに医師または薬剤師に相談してください。