

# カルボシステインドライシロップ33.3%「タイヨー」

<換算表>投与量はドライシロップとしての量(g)を示す

年齢 目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量 (g)	1日投与量 (g)
1ヶ月	4	0.12	0.36
	5	0.15	0.45
3ヶ月	6	0.18	0.54
	7	0.21	0.63
6ヶ月	8	0.24	0.72
	9	0.27	0.81
1	10	0.30	0.90
	11	0.33	0.99
	12	0.36	1.08
2	13	0.39	1.17
	14	0.42	1.26
3	15	0.45	1.35
	16	0.48	1.44
4	17	0.51	1.53
	18	0.54	1.62
5	19	0.57	1.71

  

年齢 目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量 (g)	1日投与量 (g)
6	20	0.60	1.80
	21	0.63	1.89
	22	0.66	1.98
7	23	0.69	2.07
	24	0.72	2.16
	25	0.75	2.25
8	26	0.78	2.34
	27	0.81	2.43
	28	0.84	2.52
	29	0.87	2.61
9	30	0.90	2.70
	31	0.93	2.79
	32	0.96	2.88
10	33	0.99	2.97
	34	1.02	3.06

<成分分量> 1.5g中:L-カルボシステイン 500mg

<性状> 白色～淡黄白色の粒を含む粉末(ピーチ風味)

<効能効果> <成人>

○下記疾患の去痰

上気道炎(咽頭炎、喉頭炎)、急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核

○慢性副鼻腔炎の排膿

<小児>

○下記疾患の去痰

上気道炎(咽頭炎、喉頭炎)、急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核

○慢性副鼻腔炎の排膿

○滲出性中耳炎の排液

<用法用量> <成人>

通常、成人にカルボシステインとして1回500mg(本剤1.5g)を用時懸濁し、1日3回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

<小児>

通常、幼・小児にカルボシステインとして体重kg当たり1回10mg(本剤30mg)を用時懸濁し、1日3回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。