



**グリメピリド錠 1mg・3mg「タイヨー」**  
**グリメピリドOD錠 1mg・3mg「タイヨー」**  
**を服用する際の注意点**

このお薬は、すい臓に働きかけて  
 インスリンの分泌を促す作用のある  
 糖尿病治療薬です。




**グリメピリド錠 1mg・3mg「タイヨー」**  
**グリメピリドOD錠 1mg・3mg「タイヨー」**  
**を服用する際の注意点**

このお薬は、すい臓に働きかけて  
 インスリンの分泌を促す作用のある  
 糖尿病治療薬です。




**グリメピリド錠 1mg・3mg「タイヨー」**  
**グリメピリドOD錠 1mg・3mg「タイヨー」**  
**を服用する際の注意点**

このお薬は、すい臓に働きかけて  
 インスリンの分泌を促す作用のある  
 糖尿病治療薬です。



**グリメピリド錠 1mg・3mg「タイヨー」**  
**グリメピリドOD錠 1mg・3mg「タイヨー」**  
**を服用する際の注意点**

このお薬は、すい臓に働きかけて  
 インスリンの分泌を促す作用のある  
 糖尿病治療薬です。



## 低血糖についての注意は、必ず家族やまわりの方にも知らせてください。

### ◆低血糖症状を起こすことがあります◆

この薬は血糖値を下げる薬です。まれにですが血糖値が下がりすぎる  
ことがあります。

低血糖症状を起こした時は必ず早めに医師に報告してください。

### ★低血糖症状とは…

血液中の糖分が少なくなりすぎた状態で、急に強い異常な空腹感、  
脱力感、発汗、手足のふるえ、目のちらつき等が起こったり、また  
頭が痛かったり、ぼんやりしたり、ふらついたり、いつもと人柄の  
違ったような異常な行動をとることもあります。空腹時に起こりや  
すく、食べ物をとることで良くなるのが特徴です。



頭痛・ふらつき



手足の震え・発汗



目のちらつき

### ◆服用しているときに低血糖症状を起こしたら◆

- 低血糖症状を起こした時は、早めに糖分（砂糖、ブドウ糖など）  
を服用してください。日頃から糖分を持ち歩き、その場でとれる  
ようにしておくことが必要です。

ただし、 $\alpha$ -グリコシダーゼ阻害剤（ボグリボース、アカルボース  
ミグリボースなど）を併用している場合は、必ずブドウ糖をお飲  
みください。

この注意は必ず家族やまわりの方にも知らせておいてください。

- 高所作業や自動車試験など、危険を伴う作業を行う際には、  
低血糖による事故に注意してください。

## 低血糖についての注意は、必ず家族やまわりの方にも知らせてください。

### ◆低血糖症状を起こすことがあります◆

この薬は血糖値を下げる薬です。まれにですが血糖値が下がりすぎる  
ことがあります。

低血糖症状を起こした時は必ず早めに医師に報告してください。

### ★低血糖症状とは…

血液中の糖分が少なくなりすぎた状態で、急に強い異常な空腹感、  
脱力感、発汗、手足のふるえ、目のちらつき等が起こったり、また  
頭が痛かったり、ぼんやりしたり、ふらついたり、いつもと人柄の  
違ったような異常な行動をとることもあります。空腹時に起こりや  
すく、食べ物をとることで良くなるのが特徴です。



頭痛・ふらつき



手足の震え・発汗



目のちらつき

### ◆服用しているときに低血糖症状を起こしたら◆

- 低血糖症状を起こした時は、早めに糖分（砂糖、ブドウ糖など）  
を服用してください。日頃から糖分を持ち歩き、その場でとれる  
ようにしておくことが必要です。

ただし、 $\alpha$ -グリコシダーゼ阻害剤（ボグリボース、アカルボース  
ミグリボースなど）を併用している場合は、必ずブドウ糖をお飲  
みください。

この注意は必ず家族やまわりの方にも知らせておいてください。

- 高所作業や自動車試験など、危険を伴う作業を行う際には、  
低血糖による事故に注意してください。

## 低血糖についての注意は、必ず家族やまわりの方にも知らせてください。

### ◆低血糖症状を起こすことがあります◆

この薬は血糖値を下げる薬です。まれにですが血糖値が下がりすぎる  
ことがあります。

低血糖症状を起こした時は必ず早めに医師に報告してください。

### ★低血糖症状とは…

血液中の糖分が少なくなりすぎた状態で、急に強い異常な空腹感、  
脱力感、発汗、手足のふるえ、目のちらつき等が起こったり、また  
頭が痛かったり、ぼんやりしたり、ふらついたり、いつもと人柄の  
違ったような異常な行動をとることもあります。空腹時に起こりや  
すく、食べ物をとることで良くなるのが特徴です。



頭痛・ふらつき



手足の震え・発汗



目のちらつき

### ◆服用しているときに低血糖症状を起こしたら◆

- 低血糖症状を起こした時は、早めに糖分（砂糖、ブドウ糖など）  
を服用してください。日頃から糖分を持ち歩き、その場でとれる  
ようにしておくことが必要です。

ただし、 $\alpha$ -グリコシダーゼ阻害剤（ボグリボース、アカルボース  
ミグリボースなど）を併用している場合は、必ずブドウ糖をお飲  
みください。

この注意は必ず家族やまわりの方にも知らせておいてください。

- 高所作業や自動車試験など、危険を伴う作業を行う際には、  
低血糖による事故に注意してください。

## 低血糖についての注意は、必ず家族やまわりの方にも知らせてください。

### ◆低血糖症状を起こすことがあります◆

この薬は血糖値を下げる薬です。まれにですが血糖値が下がりすぎる  
ことがあります。

低血糖症状を起こした時は必ず早めに医師に報告してください。

### ★低血糖症状とは…

血液中の糖分が少なくなりすぎた状態で、急に強い異常な空腹感、  
脱力感、発汗、手足のふるえ、目のちらつき等が起こったり、また  
頭が痛かったり、ぼんやりしたり、ふらついたり、いつもと人柄の  
違ったような異常な行動をとることもあります。空腹時に起こりや  
すく、食べ物をとることで良くなるのが特徴です。



頭痛・ふらつき



手足の震え・発汗



目のちらつき

### ◆服用しているときに低血糖症状を起こしたら◆

- 低血糖症状を起こした時は、早めに糖分（砂糖、ブドウ糖など）  
を服用してください。日頃から糖分を持ち歩き、その場でとれる  
ようにしておくことが必要です。

ただし、 $\alpha$ -グリコシダーゼ阻害剤（ボグリボース、アカルボース  
ミグリボースなど）を併用している場合は、必ずブドウ糖をお飲  
みください。

この注意は必ず家族やまわりの方にも知らせておいてください。

- 高所作業や自動車試験など、危険を伴う作業を行う際には、  
低血糖による事故に注意してください。