

# ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」

〈換算表〉 投与量はドライシロップとしての量(g)を示す

○年齢別の標準投与量:  $\div 2$

| 年齢(歳)     | 1回投与量(g) | 1日投与量(g)             |
|-----------|----------|----------------------|
| 6カ月以上3歳未満 | 0.4      | 0.8 (ケトチフェンとして0.8mg) |
| 3歳以上7歳未満  | 0.6      | 1.2 (ケトチフェンとして1.2mg) |
| 7歳以上      | 1.0      | 2 (ケトチフェンとして2.0mg)   |

ただし、1歳未満の乳児に使用する場合には体重、症状などを考慮して適宜投与量を決めること。

○体重別の標準投与量:  $\div 2$

| 体重(kg) | 1回投与量(g) | 1日投与量(g) |
|--------|----------|----------|
| 8      | 0.24     | 0.48     |
| 9      | 0.27     | 0.54     |
| 10     | 0.30     | 0.60     |
| 11     | 0.33     | 0.66     |
| 12     | 0.36     | 0.72     |
| 13     | 0.39     | 0.78     |
| 14     | 0.42     | 0.84     |
| 15     | 0.45     | 0.90     |
| 16     | 0.48     | 0.96     |
| 17     | 0.51     | 1.02     |
| 18     | 0.54     | 1.08     |
| 19     | 0.57     | 1.14     |
| 20     | 0.60     | 1.20     |
| 21     | 0.63     | 1.26     |

$\div 2$

| 体重(kg) | 1回投与量(g) | 1日投与量(g) |
|--------|----------|----------|
| 22     | 0.66     | 1.32     |
| 23     | 0.69     | 1.38     |
| 24     | 0.72     | 1.44     |
| 25     | 0.75     | 1.50     |
| 26     | 0.78     | 1.56     |
| 27     | 0.81     | 1.62     |
| 28     | 0.84     | 1.68     |
| 29     | 0.87     | 1.74     |
| 30     | 0.90     | 1.80     |
| 31     | 0.93     | 1.86     |
| 32     | 0.96     | 1.92     |
| 33     | 0.99     | 1.98     |
| 34以上   | 1.00     | 2.00     |

〈成分分量〉 1g中: ケトチフェンフマル酸塩 1.38mg(ケトチフェンとして1mg)

〈性状〉 白色の細粒で、芳香があり、味は甘い(ヨーグルト風味)

〈効能効果〉 気管支喘息、アレルギー性鼻炎、湿疹・皮膚炎、蕁麻疹、皮膚瘙痒症

〈用法用量〉 通常、小児には1日量0.06g/kg(ケトチフェンとして0.06mg/kg)を2回、朝食後及び就寝前に分け、用時溶解して経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。

年齢別の標準投与量は、通常、下記の用量を1日量とし、1日2回、朝食後及び就寝前に分け、経口投与する。