

ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」

- 【組成】 1mL中：ケトチフェンフマル酸塩・・・0.276mg（ケトチフェンとして0.2mg）
- 【性状】 無色～微黄色澄明の液で、芳香があり、味は甘い（ストロベリー風味）
- 【用法・用量】 通常、小児には1日量0.3mL/kg（ケトチフェンとして0.06mg/kg）を2回、朝食後及び就寝前に分けて経口投与する。
 なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。
 年齢別の標準投与量は、通常、下記の用量を1日量とし、1日2回朝食後及び就寝前に分けて経口投与する。

年 齢	1日用量	
	ケトチフェンシロップ0.02% 「タイヨー」として	ケトチフェン として
6ヶ月以上3歳未満	4mL	0.8mg
3歳以上7歳未満	6mL	1.2mg
7歳以上	10mL	2.0mg

【参考】

年 齢 目 安 (才)	体 重 (kg)	1回投与量		1日投与量	
		シロップ (mL)	ケトチフェンとして (mg)	シロップ (mL)	ケトチフェンとして (mg)
6ヶ月	8	1.2	0.24	2.4	0.48
	9	1.4	0.27	2.7	0.54
1	10	1.5	0.30	3.0	0.60
	11	1.7	0.33	3.3	0.66
2	12	1.8	0.36	3.6	0.72
	13	2.0	0.39	3.9	0.78
3	14	2.1	0.42	4.2	0.84
	15	2.3	0.45	4.5	0.90
4	16	2.4	0.48	4.8	0.96
	17	2.6	0.51	5.1	1.02
5	18	2.7	0.54	5.4	1.08
	19	2.9	0.57	5.7	1.14
6	20	3.0	0.60	6.0	1.20
	21	3.2	0.63	6.3	1.26
7	22	3.3	0.66	6.6	1.32
	23	3.5	0.69	6.9	1.38
8	24	3.6	0.72	7.2	1.44
	25	3.8	0.75	7.5	1.50
9	26	3.9	0.78	7.8	1.56
	27	4.1	0.81	8.1	1.62
10	28	4.2	0.84	8.4	1.68
	29	4.4	0.87	8.7	1.74
9	30	4.5	0.90	9.0	1.80
	31	4.7	0.93	9.3	1.86
10	32	4.8	0.96	9.6	1.92
	33	5.0	0.99	9.9	1.98
10	34	5.0	1.00	10.0	2.00

