

# セフジニル 細粒小児用10%「タイヨー」

〈換算表〉投与量は細粒としての量(g)を示す

年齢 目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量(g)	1日投与量(g)
1ヶ月	4	0.12 ~ 0.24	0.36 ~ 0.72
	5	0.15 ~ 0.30	0.45 ~ 0.90
3ヶ月	6	0.18 ~ 0.36	0.54 ~ 1.08
	7	0.21 ~ 0.42	0.63 ~ 1.26
6ヶ月	8	0.24 ~ 0.48	0.72 ~ 1.44
	9	0.27 ~ 0.54	0.81 ~ 1.62
1	10	0.30 ~ 0.60	0.90 ~ 1.80
	11	0.33 ~ 0.66	0.99 ~ 1.98
2	12	0.36 ~ 0.72	1.08 ~ 2.16
	13	0.39 ~ 0.78	1.17 ~ 2.34
3	14	0.42 ~ 0.84	1.26 ~ 2.52
	15	0.45 ~ 0.90	1.35 ~ 2.70
4	16	0.48 ~ 0.96	1.44 ~ 2.88
	17	0.51 ~ 1.00	1.53 ~ 3.00
5	18	0.54 ~ 1.00	1.62 ~ 3.00
	19	0.57 ~ 1.00	1.71 ~ 3.00

年齢 目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量(g)	1日投与量(g)
6	20	0.60 ~ 1.00	1.80 ~ 3.00
	21	0.63 ~ 1.00	1.89 ~ 3.00
	22	0.66 ~ 1.00	1.98 ~ 3.00
7	23	0.69 ~ 1.00	2.07 ~ 3.00
	24	0.72 ~ 1.00	2.16 ~ 3.00
	25	0.75 ~ 1.00	2.25 ~ 3.00
8	26	0.78 ~ 1.00	2.34 ~ 3.00
	27	0.81 ~ 1.00	2.43 ~ 3.00
	28	0.84 ~ 1.00	2.52 ~ 3.00
9	29	0.87 ~ 1.00	2.61 ~ 3.00
	30	0.90 ~ 1.00	2.70 ~ 3.00
	31	0.93 ~ 1.00	2.79 ~ 3.00
10	32	0.96 ~ 1.00	2.88 ~ 3.00
	33	0.99 ~ 1.00	2.97 ~ 3.00
	34	1.00	3.00

※成人用製剤(カプセル剤)の用法用量

通常、セフジニルとして成人1回100mg(力価)(本剤1カプセル)を1日3回経口投与する。  
 なお、年齢及び症状に応じて適宜増減する。

〈成分分量〉 1g中:セフジニル 100mg (力価)

〈性状〉 芳香があり、味は甘い、淡赤白色の細粒剤(ストロベリー風味)

〈効能効果〉 〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハマラ)・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌

〈適応症〉

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱

〈用法用量〉 通常、小児に対してセフジニルとして1日量9~18mg(力価)/kg(本剤0.09~0.18g/kg)を3回に分割して経口投与する。なお、年齢及び症状に応じて適宜増減する。