

セフジトレンピボキシシル小児用細粒10%「タイヨー」

<換算表> 投与量は細粒としての量(g)を示す

年齢目安(才)	体重(kg)	×3		年齢目安(才)	体重(kg)	×3		
		1回投与量(g)	1日投与量(g)			1回投与量(g)	1日投与量(g)	
1ヶ月	4	0.12	0.36	6	20	0.60	1.80	
	5	0.15	0.45		21	0.63	1.89	
3ヶ月	6	0.18	0.54		22	0.66	1.98	
	7	0.21	0.63		7	23	0.69	2.07
6ヶ月	8	0.24	0.72			24	0.72	2.16
	9	0.27	0.81			25	0.75	2.25
1	10	0.30	0.90		26	0.78	2.34	
	11	0.33	0.99		8	27	0.81	2.43
2	12	0.36	1.08			28	0.84	2.52
	13	0.39	1.17			29	0.87	2.61
3	14	0.42	1.26	30	0.90	2.70		
	15	0.45	1.35	9	31	0.93	2.79	
4	16	0.48	1.44		32	0.96	2.88	
	17	0.51	1.53		33	0.99	2.97	
5	18	0.54	1.62	10	34	1.00	3.00	
	19	0.57	1.71					

※成人用製剤(錠剤)の用法用量

通常、成人にはセフジトレン ピボキシシルとして1回100mg(力価)を1日3回食後に経口投与する。

なお、年齢及び症状に応じて適宜増減するが、重症又は効果不十分と思われる場合は、1回200mg(力価)を1日3回食後に経口投与する。

<成分分量> 1g中:セフジトレン ピボキシシル 100mg(力価)

<性状> 芳香があり、味は甘味及びわずかな苦味を有する、だいたい色の細粒剤(オレンジ風味)

<効能効果> <適応菌種>

セフジトレンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、百日咳菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、アクネ菌

<適応症>

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、顎炎、猩紅熱、百日咳

<用法用量> 通常、小児にセフジトレン ピボキシシルとして、1回3mg(力価)/kgを1日3回食後に経口投与する。

なお、年齢、症状に応じて適宜増減する。