

シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「タイヨー」

- 【組成】 1mL中：シプロヘプタジン塩酸塩水和物 0.4mg
 【性状】 特異なおいがあり、甘味を有する黄色澄明のシロップ剤(パイナップル風味)
 【用法・用量】 シプロヘプタジン塩酸塩水和物として、通常成人1回4mg（本剤10mL）を1日1～3回経口投与する。
 なお、年齢、症状により適宜増減する。

年齢 目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量		1日投与量					
				1日1回の場合		1日2回の場合		1日3回の場合	
		シロップ (mL)	シプロヘプタジン塩酸塩水和物 (mg)	シロップ (mL)	シプロヘプタジン塩酸塩水和物 (mg)	シロップ (mL)	シプロヘプタジン塩酸塩水和物 (mg)	シロップ (mL)	シプロヘプタジン塩酸塩水和物 (mg)
1	10	2.4	0.96	2.4	0.96	4.8	1.92	7.2	2.88
2	12	2.8	1.12	2.8	1.12	5.6	2.24	8.4	3.36
3	14	3.2	1.28	3.2	1.28	6.4	2.56	9.6	3.84
4	16	3.6	1.44	3.6	1.44	7.2	2.88	10.8	4.32
5	19	4.0	1.60	4.0	1.60	8.0	3.20	12.0	4.80
6	21	4.4	1.76	4.4	1.76	8.8	3.52	13.2	5.28
7	24	4.8	1.92	4.8	1.92	9.6	3.84	14.4	5.76
8	27	5.2	2.08	5.2	2.08	10.4	4.16	15.6	6.24
9	31	5.6	2.24	5.6	2.24	11.2	4.48	16.8	6.72
10	34	6.0	2.40	6.0	2.40	12.0	4.80	18.0	7.20

※Augsberger式[$=[(年齢 \times 4 + 20) / 100] \times 成人量$]より算出

