

# セフィナーナ 細粒 100

〈換算表〉投与量は細粒としての量(g)を示す

[通常の場合]

年齢目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量 (g)	1日投与量 (g)
1ヶ月	4	0.06 ~ 0.12	0.12 ~ 0.24
	5	0.08 ~ 0.15	0.16 ~ 0.30
3ヶ月	6	0.09 ~ 0.18	0.18 ~ 0.36
	7	0.11 ~ 0.21	0.22 ~ 0.42
6ヶ月	8	0.12 ~ 0.24	0.24 ~ 0.48
	9	0.14 ~ 0.27	0.28 ~ 0.54
1	10	0.15 ~ 0.30	0.30 ~ 0.60
	11	0.17 ~ 0.33	0.34 ~ 0.66
2	12	0.18 ~ 0.36	0.36 ~ 0.72
	13	0.20 ~ 0.39	0.40 ~ 0.78
3	14	0.21 ~ 0.42	0.42 ~ 0.84
	15	0.23 ~ 0.45	0.46 ~ 0.90
4	16	0.24 ~ 0.48	0.48 ~ 0.96
	17	0.26 ~ 0.51	0.52 ~ 1.02
5	18	0.27 ~ 0.54	0.54 ~ 1.08
	19	0.29 ~ 0.57	0.58 ~ 1.14
6	20	0.30 ~ 0.60	0.60 ~ 1.20
	21	0.32 ~ 0.63	0.64 ~ 1.26
7	22	0.33 ~ 0.66	0.66 ~ 1.32
	23	0.35 ~ 0.69	0.70 ~ 1.38
8	24	0.36 ~ 0.72	0.72 ~ 1.44
	25	0.38 ~ 0.75	0.76 ~ 1.50
8	26	0.39 ~ 0.78	0.78 ~ 1.56
	27	0.41 ~ 0.81	0.82 ~ 1.62
8	28	0.42 ~ 0.84	0.84 ~ 1.68
	29	0.44 ~ 0.87	0.88 ~ 1.74
※30以上		0.50 ~ 1.00	1.00 ~ 2.00

[重症又は効果不十分の場合]

年齢目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量 (g)	1日投与量 (g)
1ヶ月	4	0.24	0.48
	5	0.30	0.60
3ヶ月	6	0.36	0.72
	7	0.42	0.84
6ヶ月	8	0.48	0.96
	9	0.54	1.08
1	10	0.60	1.20
	11	0.66	1.32
2	12	0.72	1.44
	13	0.78	1.56
3	14	0.84	1.68
	15	0.90	1.80
4	16	0.96	1.92
	17	1.02	2.04
5	18	1.08	2.16
	19	1.14	2.28
6	20	1.20	2.40
	21	1.26	2.52
7	22	1.32	2.64
	23	1.38	2.76
8	24	1.44	2.88
	25	1.50	3.00
8	26	1.56	3.12
	27	1.62	3.24
8	28	1.68	3.36
	29	1.74	3.48
※30以上		2.00	4.00

〈成分分量〉 1g中 セフィキシム 100mg(力価)

〈性状〉 芳香を有し、味は甘い、淡いだいだい色の細粒剤

〈効能効果〉 〈適応菌種〉本剤に感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ(ブランハマ)・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロピデンシア属、インフルエンザ菌

〈適応症〉急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、胆嚢炎、胆管炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱

〈用法用量〉 通常、小児に対しては、セフィキシムとして1回1.5~3mg(力価)/kgを1日2回経口投与する。なお、症状に応じて適宜増減するが、重症又は効果不十分と思われる症例には、セフィキシムとして1回6mg(力価)/kgを1日2回経口投与する。