

# セフィナーナ 細粒50

〈換算表〉投与量は細粒としての量(g)を示す

[通常の場合]

年齢目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量 (g)	1日投与量 (g)
1ヶ月	4	0.12 ~ 0.24	0.24 ~ 0.48
	5	0.15 ~ 0.30	0.30 ~ 0.60
3ヶ月	6	0.18 ~ 0.36	0.36 ~ 0.72
	7	0.21 ~ 0.42	0.42 ~ 0.84
6ヶ月	8	0.24 ~ 0.48	0.48 ~ 0.96
	9	0.27 ~ 0.54	0.54 ~ 1.08
1	10	0.30 ~ 0.60	0.60 ~ 1.20
	11	0.33 ~ 0.66	0.66 ~ 1.32
2	12	0.36 ~ 0.72	0.72 ~ 1.44
	13	0.39 ~ 0.78	0.78 ~ 1.56
3	14	0.42 ~ 0.84	0.84 ~ 1.68
	15	0.45 ~ 0.90	0.90 ~ 1.80
4	16	0.48 ~ 0.96	0.96 ~ 1.92
	17	0.51 ~ 1.02	1.02 ~ 2.04
5	18	0.54 ~ 1.08	1.08 ~ 2.16
	19	0.57 ~ 1.14	1.14 ~ 2.28
6	20	0.60 ~ 1.20	1.20 ~ 2.40
	21	0.63 ~ 1.26	1.26 ~ 2.52
7	22	0.66 ~ 1.32	1.32 ~ 2.64
	23	0.69 ~ 1.38	1.38 ~ 2.76
8	24	0.72 ~ 1.44	1.44 ~ 2.88
	25	0.75 ~ 1.50	1.50 ~ 3.00
8	26	0.78 ~ 1.56	1.56 ~ 3.12
	27	0.81 ~ 1.62	1.62 ~ 3.24
8	28	0.84 ~ 1.68	1.68 ~ 3.36
	29	0.87 ~ 1.74	1.74 ~ 3.48
30以上	1.00 ~ 2.00	2.00 ~ 4.00	

[重症又は効果不十分の場合]

年齢目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量 (g)	1日投与量 (g)
1ヶ月	4	0.48	0.96
	5	0.60	1.20
3ヶ月	6	0.72	1.44
	7	0.84	1.68
6ヶ月	8	0.96	1.92
	9	1.08	2.16
1	10	1.20	2.40
	11	1.32	2.64
2	12	1.44	2.88
	13	1.56	3.12
3	14	1.68	3.36
	15	1.80	3.60
4	16	1.92	3.84
	17	2.04	4.08
5	18	2.16	4.32
	19	2.28	4.56
6	20	2.40	4.80
	21	2.52	5.04
7	22	2.64	5.28
	23	2.76	5.52
8	24	2.88	5.76
	25	3.00	6.00
8	26	3.12	6.24
	27	3.24	6.48
8	28	3.36	6.72
	29	3.48	6.96
30以上	4.00	8.00	

〈成分分量〉1g中 セフィキシム 50mg(力価)

〈性状〉芳香を有し、味は甘い、淡いだいだい色の細粒剤

〈効能効果〉〈適応菌種〉本剤に感性のレンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌

〈適応症〉急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、胆嚢炎、胆管炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱

〈用法用量〉通常、小児に対しては、セフィキシムとして1回1.5~3mg(力価)/kgを1日2回経口投与する。なお、症状に応じて適宜増減するが、重症又は効果不十分と思われる症例には、セフィキシムとして1回6mg(力価)/kgを1日2回経口投与する。