

トラネキサム酸シロップ5%「タイヨー」

【組成】 1mL中：トラネキサム酸・・・50mg

【性状】 オレンジ様の芳香と甘味を有するだいたい色のシロップ剤

【用法・用量】 通常下記1日量を3～4回に分割経口投与する。

年齢(才)	～1	2～3	4～6	7～14	15～	
1日量	トラネキサム酸として(mg)	75～200	150～350	250～650	400～1,000	750～2,000
	本剤として(mL)	1.5～4	3～7	5～13	8～20	15～40

なお、症状により適宜増減する。

【参考】

年齢	1回投与量				1日投与量	
	1日3回の場合		1日4回の場合		シロップ (mL)	トラネキサム酸として (mg)
	シロップ (mL)	トラネキサム酸として (mg)	シロップ (mL)	トラネキサム酸として (mg)		
～1才	0.5 ～ 1.3	25.0 ～ 66.7	0.4 ～ 1.0	18.8 ～ 50.0	1.5 ～ 4	75 ～ 200
2～3才	1.0 ～ 2.3	50.0 ～ 116.7	0.8 ～ 1.8	37.5 ～ 87.5	3 ～ 7	150 ～ 350
4～6才	1.7 ～ 4.3	83.3 ～ 216.7	1.3 ～ 3.3	62.5 ～ 162.5	5 ～ 13	250 ～ 650
7～14才	2.7 ～ 6.7	133.3 ～ 333.3	2.0 ～ 5.0	100.0 ～ 250.0	8 ～ 20	400 ～ 1,000
15才～	5.0 ～ 13.3	250.0 ～ 666.7	3.8 ～ 10.0	187.5 ～ 500.0	15 ～ 40	750 ～ 2,000

