


トレキサメットカプセル2mgは  
関節リウマチのお薬です。

## お薬の飲み方

- ◆ 一週間のうち、決められた日にだけ服用します。シート表面に記載された日時を確認してください。
- ◆ 1回に飲むカプセルの数も、決められた量を守ってください。
- ◆ 服用するときはコップ一杯の水と一緒に飲んでください。

このお薬を服用される患者様へ

# トレキサメット<sup>®</sup> カプセル2mg




トレキサメットカプセル2mgは  
関節リウマチのお薬です。

## お薬の飲み方

- ◆ 一週間のうち、決められた日にだけ服用します。シート表面に記載された日時を確認してください。
- ◆ 1回に飲むカプセルの数も、決められた量を守ってください。
- ◆ 服用するときはコップ一杯の水と一緒に飲んでください。

このお薬を服用される患者様へ

# トレキサメット<sup>®</sup> カプセル2mg



## 🌀 ご相談ください 🌀

- ① 以下の症状が出たらこのお薬を飲むのをやめて、すぐにかかりつけの医師にご相談ください。  
(次の診察日まで待たないでください)
  - ・発疹
  - ・せき(からせき)
  - ・息切れ
  - ・息苦しさ
  - ・口内炎
  - ・(ひどく)疲れやすい
- ② 妊娠に気づいたら、すぐにかかりつけの医師に申し出てください。
- ③ 他の病院にかかった時には、医師にこのお薬を飲んでいる事を申し出てください。

### 定期的に血液検査を受けてください

※定期的に血液検査をすることで重症化を防ぐことができる副作用があります。

## 🌀 ご注意ください 🌀

- ① 必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- ② 飲み忘れた分は飲まないでください。
- ③ このお薬で治療を受けている間はなるべくお酒を飲まないでください。
- ④ 先生の指示なしに、ほかのお薬(特に痛み止め、風邪ぐすり等)を飲まないでください。
- ⑤ 妊娠中の方、授乳中の方は飲まないでください。
- ⑥ このお薬で治療を受けている間は、妊娠しない(させない)でください。

病院・医院・薬局



## 🌀 ご相談ください 🌀

- ① 以下の症状が出たらこのお薬を飲むのをやめて、すぐにかかりつけの医師にご相談ください。  
(次の診察日まで待たないでください)
  - ・発疹
  - ・せき(からせき)
  - ・息切れ
  - ・息苦しさ
  - ・口内炎
  - ・(ひどく)疲れやすい
- ② 妊娠に気づいたら、すぐにかかりつけの医師に申し出てください。
- ③ 他の病院にかかった時には、医師にこのお薬を飲んでいる事を申し出てください。

### 定期的に血液検査を受けてください

※定期的に血液検査をすることで重症化を防ぐことができる副作用があります。

## 🌀 ご注意ください 🌀

- ① 必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- ② 飲み忘れた分は飲まないでください。
- ③ このお薬で治療を受けている間はなるべくお酒を飲まないでください。
- ④ 先生の指示なしに、ほかのお薬(特に痛み止め、風邪ぐすり等)を飲まないでください。
- ⑤ 妊娠中の方、授乳中の方は飲まないでください。
- ⑥ このお薬で治療を受けている間は、妊娠しない(させない)でください。

病院・医院・薬局

