

バッサミン配合錠A81の生物学的同等性試験

1. 試験目的

バッサミン配合錠A81は、アスピリンと制酸緩衝剤である炭酸マグネシウム及びジヒドロキシアルミニウムアミノアセテートを配合した抗血小板剤である。今回、本製剤の生物学的同等性試験を実施したので報告する。

2. 試験方法

被験者：健康成人男子

投与方法：クロスオーバー法 水100mLと共に絶食単回経口投与

投与量：1錠(アスピリンとして81mg)

標準製剤：ライオン(株)製造 小児用バファリン

(現在の製造販売名・会社と異なる場合があります)

試験実施期間：平成5年9月1日～平成5年10月31日

測定対象：血漿中未変化体濃度

測定方法：HPLC法

3. 試験結果

得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。




図1 平均血漿中濃度推移

○：自社製剤、●：標準製剤、n=14、平均±標準偏差

表1 薬物動態パラメータ (n=14、平均±標準偏差)

	投与量(mg)	AUC ₀₋₄ (μg·hr/mL)	Cmax(μg/mL)	Tmax(hr)	T _{1/2} (hr)
自社製剤	81	1.25±0.27	1.39±0.21	0.37±0.12	0.599±0.159
標準製剤	81	1.16±0.22	1.43±0.24	0.36±0.11	0.698±0.566

AUC₀₋₄：0～4時間の血漿中濃度－時間曲線下面積、Cmax：最高血漿中濃度

Tmax：最高血漿中濃度到達時間、T_{1/2}：消失半減期

表2 同等性の判定結果

項目	Cmax	AUC ₀₋₄
母平均の比	0.97	1.07
90%信頼区間	log(0.89)～log(1.07)	log(0.96)～log(1.19)
判定基準 log(0.80)～log(1.25)	適合	適合

図2-1 各被験者の血漿中濃度推移
 ○：バッサミン配合錠A81、●：小児用バファリン











図2-2 各被験者の血漿中濃度推移
 ○：バッサミン配合錠A81、●：小児用バファリン

