

※※印：2009年9月改訂(第12版)
 ※印：2008年6月改訂

日本標準商品分類番号
873399

貯法：室温保存
 使用期限：外装に表示の使用期限内に使用すること。
 取扱い上の注意：「取扱い上の注意」の項参照

承認番号	22100AMX01089000
薬価収載	2009年 9月
販売開始	2000年11月
再評価結果 (品質再評価)	2008年 5月
効能追加	2005年10月

抗血小板剤

※ **バッサミン® 配合錠 A81**

BASSAMIN-A81
 制酸緩衝アスピリン錠

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- 本剤及び本剤の成分又はサリチル酸系製剤に対し過敏症の既往歴のある患者
- 消化性潰瘍のある患者(ただし、「慎重投与」の項参照)
 [胃出血の発現又は消化性潰瘍が悪化するおそれがある]
- 出血傾向のある患者[出血を増強するおそれがある]
- アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発)又はその既往歴のある患者[重症喘息発作を誘発するおそれがある]
- 出産予定日12週以内の妊婦(「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照)
- 低出生体重児、新生児又は乳児[錠剤である本剤の嚥下が不能である]

※【組成・性状】

組成	1錠中：アスピリン……………81mg 炭酸マグネシウム……………22mg ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート……………11mg (添加物) アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸、硬化油、サッカリンナトリウム水和物、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、タルク、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、部分アルファー化デンプン、プルラン、D-マンニトール、黄色5号アルミニウムレーキ、香料		
性状	わずかに芳香を有する淡橙色の素錠		
識別コード(PTP)	345 81mg		
外形(サイズ)	表(直径mm)  8.0	裏(重量mg)  190	断面(厚さmm)  3.6

【効能・効果】

- 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制
 狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)
 心筋梗塞
 虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞)
- 冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後における血栓・塞栓形成の抑制
- 川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)

【用法・用量】

- 狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)、心筋梗塞、虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞)における血栓・塞栓形成の抑制、冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後における血栓・塞栓形成の抑制に使用する場合は：
 通常、成人には1錠(アスピリンとして81mg)を1回量として、1日1回経口投与する。
 なお、症状により1日4錠(アスピリンとして324mg)まで増量できる。
- 川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)に使用する場合は：
 急性期有熱期間は、アスピリンとして1日体重1kgあたり30~50mgを3回に分けて経口投与する。解熱後の回復期から慢性期は、アスピリンとして1日体重1kgあたり3~5mgを1回経口投与する。なお、症状に応じて適宜増減する。

《用法・用量に関連する使用上の注意》

- 空腹時の投与は避けることが望ましい。
- 心筋梗塞及び経皮経管冠動脈形成術に対する投与に際しては、初期投与量として維持量の数倍が必要とされていることに留意すること。¹⁾
- 原則として川崎病の診断がつき次第、投与を開始することが望ましい。²⁾

- 川崎病では発症後数ヵ月間、血小板凝集能が亢進しているため、川崎病の回復期において、本剤を発症後2~3ヵ月間投与し、その後断層心エコー図等の冠動脈検査で冠動脈障害が認められない場合には、本剤の投与を中止すること。冠動脈瘤を形成した症例では、冠動脈瘤の退縮が確認される時期まで投与を継続することが望ましい。²⁾³⁾
- 川崎病の治療において、低用量では十分な血小板機能の抑制が認められない場合もあるため、適宜、血小板凝集能の測定等を考慮すること。

【使用上の注意】

- 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
 - 消化性潰瘍の既往歴のある患者[消化性潰瘍が再発するおそれがある]
 - 血液の異常又はその既往歴のある患者[副作用が強くあらわれることがある]
 - 出血傾向の素因のある患者[出血を増強するおそれがある]
 - 肝障害又はその既往歴のある患者[副作用が強くあらわれることがある]
 - 腎障害又はその既往歴のある患者[副作用が強くあらわれることがある]
 - 高血圧の患者[血管や臓器等の障害箇所に出血が起こることがある]
 - 過敏症の既往歴のある患者
 - 気管支喘息のある患者[喘息発作が誘発されるおそれがある]
 - アルコール飲料の常用者[胃出血の危険性が増加することがある](「相互作用」の項参照)
 - 高齢者(「高齢者への投与」の項参照)
 - 妊婦(ただし、出産予定日12週以内の妊婦は禁忌)又は妊娠している可能性のある婦人(「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照)
 - 小児(「重要な基本的注意」及び「小児等への投与」の項参照)
 - 手術、心臓カテーテル検査又は抜歯前1週間以内の患者[失血量を増加させるおそれがある]
 - 非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与による消化性潰瘍のある患者で、本剤の長期投与が必要であり、かつミズプロストールによる治療が行われている患者[ミズプロストールによる非ステロイド性消炎鎮痛剤により生じた消化性潰瘍を効能・効果としているが、ミズプロストールによる治療に抵抗性を示す消化性潰瘍もあるので、本剤を継続投与する場合には、十分経過を観察し、慎重に投与すること]
 - 月経過多の患者[月経血が増加するおそれがある]
- 重要な基本的注意
 - サリチル酸系製剤の使用実態は我が国と異なるものの、米国においてサリチル酸系製剤とライ症候群との関連性を示す疫学調査報告があるので、本剤を15歳未満の水痘、インフルエンザの患者に投与しないことを原則とするが、やむを得ず投与する場合には、慎重に投与し、投与後の患者の状態を十分に観察すること。[ライ症候群：小児において極めてまれに水痘、インフルエンザ等のウイルス性疾患の先行後、激しい嘔吐、意識障害、痙攣(急性脳浮腫)と肝臓ほか諸臓器の脂肪沈着、ミトコンドリア変形、AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・CK(CPK)の急激な上昇、高アンモニア血症、低プロトロンビン血症、低血糖等の症状が短期間に発現する高死亡率の病態である]
 - 脳梗塞患者への投与にあたっては、他の血小板凝集を抑制する薬剤等との相互作用に注意するとともに、高血圧が持続する患者への投与は慎重に行い、投与中は十分な血圧のコントロールを行うこと。
 - 長期投与する場合には定期的に臨床検査(尿検査、血液検査及び肝機能検査等)を行うこと。また、異常が認められた場合には減量、休薬等の適切な措置を講ずること。
 - 川崎病の急性期に対して投与する場合には、適宜、肝機能検査を行い異常が認められた場合には減量、休薬等の適切な措置を講ずること。
 - 他の消炎鎮痛剤との併用は避けさせることが望ましい。(「相互作用」の項参照)



3 相互作用 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
痛風治療剤 スルフィンピラ ゾン プロベネシド	痛風治療剤の尿酸 排泄作用を減弱さ せる。	本剤が痛風治療剤の尿酸排 泄に拮抗する。
抗血小板剤 チクロピジン塩 酸塩 シロスタゾール オザグレルナト リウム 等 抗凝血剤 ワルファリン ヘパリン製剤 等 血栓溶解剤 ウロキナーゼ製 剤 t-PA製剤 等 プロスタグランジ ンE ₁ 製剤及びI ₂ 誘 導体製剤	出血傾向が増強す ることがある。	相互に作用を増強すると考 えられている。
糖尿病用剤 インシュリン製 剤 トルブタミド 等	血糖降下作用を増 強することがある ので注意し、必要 があれば減量する。	サリチル酸自身が血糖降下 作用をもつ。また、血漿蛋 白と結合したスルホニル尿 素系血糖降下剤(トルブタミ ド等)と置換し、遊離のスル ホニル尿素系血糖降下剤が 増加すると考えられている。
メトトレキサート	本剤及びメトトレ キサートの作用を 増強し、メトトレ キサートの中毒症 状が発現すること がある。	本剤がメトトレキサートの 腎排泄を抑制し、メトトレ キサートの血中濃度が上昇 するため、また、メトトレ キサートの蛋白結合部位で 置換し、遊離のメトトレキ サートが増加するためと考 えられている。
リチウム製剤	血中リチウム濃度 を上昇させ、リチ ウム中毒を起こす おそれがある。	本剤の腎におけるプロスタ グランジン合成抑制作用 により、リチウムの腎排泄 が減少し、血中濃度が上昇 するためと考えられる。
チアジド系利尿剤	利尿・降圧作用を 減弱するおそれ がある。	本剤の腎におけるプロスタ グランジン合成抑制作用 により、水・ナトリウムの 排泄を減少させるためと考 えられている。
フロセミド アゾセミド ビレタニド	本剤の副作用が増 強することがある。	腎の排泄部位にて本剤と競 合する。
非ステロイド性消 炎鎮痛剤 インドメタシン ジクロフェナク ナトリウム フェンプロフェ ンカルシウム 等	非ステロイド性消 炎鎮痛剤の血中濃 度が低下し作用を 減弱することがある。 出血を増加し、腎 機能低下をもたら すことがある。	非ステロイド性消炎鎮痛剤 の吸収阻害あるいは血漿蛋 白結合部位での遊離置換が 考えられている。 機序は不明である。
イブプロフェン	本剤の血小板凝集 抑制作用を減弱す るとの報告がある。	イブプロフェンが血小板の シクロオキシゲナーゼ-1 (COX-1)と本剤の結合を阻 害するためと考えられる。
オキシカム系消炎 鎮痛剤 ピロキシカム等	両剤又は一方の薬 剤の副作用の発現 頻度を増加させる おそれがある。	機序は不明である。
アルミノプロフェ ン	ラットの試験でア スピリンの胃潰瘍 を増強したとの報 告がある。	アスピリンの胃粘膜バリアー 破壊作用にアルミノプロフェ ンの胃障害が相乗的に作用し、 増悪すると考えられている。
ニトログリセリン	ニトログリセリン の作用を減弱する おそれがある。	本剤は血管内皮細胞から産 生され血管拡張作用を有す るプロスタグランジンI ₂ 等 の合成を阻害し、ニトログ リセリンの血管拡張作用を減 弱させる可能性が考えられる。
テトラサイクリン 系抗生物質 ニューキノロン系 抗菌剤	テトラサイクリン 系抗生物質又はニ ューキノロン系抗 菌剤の作用を減弱 させ、抗菌力が低 下する。	本剤中の制酸緩衝剤が消化 管内でテトラサイクリン系 抗生物質又はニューキノロ ン系抗菌剤と難溶性のキレ ートを作り、これらの医薬 品の消化管からの吸収を阻 害し、血中濃度が低下する ためと考えられている。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
副腎皮質ホルモン 剤 ベタメタゾン コルチゾン酢酸 エステル メチルプレドニ ゾン 等	高用量の本剤とこ れらの薬剤の併用 時、これらの薬剤 を減量する際、本 剤の血中濃度が増 加し、サリチル酸 中毒を起こすこと が報告されている ので、併用する場 合には用量に注意 する。	副腎皮質ホルモン剤は、サ リチル酸の腎排泄と肝代謝 を著しく増加し、サリチル 酸濃度を治療域以下にする といわれており、副腎皮質 ホルモン剤との併用時には、 サリチル酸の投与量を増量 することがあるので、副腎 皮質ホルモン剤を減量又は 中止するときには注意する。
乳酸ナトリウム	本剤の尿中排泄を 増加することがあ る。	乳酸ナトリウムのアルカリ 化作用により、本剤の尿中 排泄が促進するためと考え られる。
バルプロ酸ナトリ ウム	バルプロ酸ナトリ ウムの作用を増強 し、振戦等を起こ すことがある。	アスピリンは血漿蛋白に結 合したバルプロ酸ナトリウ ムと置換し、遊離させる。
フェニトイン	フェニトインの総 濃度を減少する。	アスピリンは蛋白結合フェ ニトインを置換することが ある。
アセタゾラミド	アセタゾラミドの 副作用を増強し、 嗜眠、錯乱等の中 枢神経系症状、代 謝性アシドーシス 等を起こすことが 報告されている。	アスピリンは血漿蛋白に結 合したアセタゾラミドと置 換し、遊離させる。
アンジオテンシン 変換酵素阻害剤 (ACE阻害剤)	ACE阻害剤の降圧 作用が減弱するこ とがある。	本剤はACE阻害剤のプロス タグランジン生成作用に 拮抗する。
β -遮断剤	β -遮断剤の降圧 作用が減弱するこ とがある。	本剤がプロスタグランジン 合成を抑制し、 β -遮断剤 の降圧作用に拮抗する。
ドネベジル塩酸塩	消化性潰瘍を起こ すことがある。	コリン系が賦活され胃酸分 泌が促進される。
タクロリムス水和 物 シクロスポリン	腎障害が発現する ことがある。	腎障害の副作用が相互に増 強されると考えられる。
ザフィルルカスト	ザフィルルカスト の血漿中濃度が上 昇することがある。	機序不明。
プロスタグランジ ンD ₂ 受容体拮抗剤 セラトロダスト ラマトロバン	ヒト血漿蛋白結合 に対する相互作用 の検討(in vitro) において、本剤に よりこれら薬剤の 非結合型分率が上 昇することがある。	これら薬剤が本剤と血漿蛋 白結合部位で置換し、遊離 型血中濃度が上昇すると考 えられる。
アルコール	消化管出血が増強 されるおそれがあ る。	アルコールによる胃粘膜障 害と本剤のプロスタグラン ジン合成阻害作用により、 相加的に消化管出血が増強 すると考えられる。

4 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用(頻度不明)

- 1) ショック、アナフィラキシー様症状 ショックやアナフィラキシー様症状(呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) 出血
脳出血等の頭蓋内出血 脳出血等の頭蓋内出血(初期症状：頭痛、悪心・嘔吐、意識障害、片麻痺等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
肺出血、消化管出血、鼻出血、眼底出血等 肺出血、消化管出血、鼻出血、眼底出血等があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 3) 皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症(Lyell症候群) 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死症(Lyell症候群)、剥脱性皮膚炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 4) 再生不良性貧血、血小板減少、白血球減少 再生不良性貧血、血小板減少、白血球減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 5) 喘息発作の誘発 喘息発作を誘発することがある。

- 6) 肝機能障害、黄疸 AST(GOT)、ALT(GPT)、 γ -GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。
- 7) 消化性潰瘍、小腸・大腸潰瘍 下血(メレナ)を伴う胃潰瘍・十二指腸潰瘍等の消化性潰瘍があらわれることがある。また、消化管出血、腸管穿孔を伴う小腸・大腸潰瘍があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- (2) その他の副作用

	5%以上又は頻度不明	0.1~5%未満	0.1%未満
消化器	胃腸障害、嘔吐、腹痛、胸やけ、便秘、下痢、食道炎、口唇腫脹、吐血、吐き気	悪心、食欲不振、振、胃部不快感	
過敏症	蕁麻疹	発疹、浮腫	
皮膚	掻痒、皮疹、発汗		
精神神経系	めまい、興奮	頭痛	
肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇		
腎臓			腎障害
循環器	血圧低下、血管炎	心窩部痛	
呼吸器	過呼吸、気管支炎、鼻出血	鼻炎	
感覚器	角結膜炎	耳鳴、難聴	
血液			貧血
その他	代謝性アシドーシス	倦怠感	

5 高齢者への投与

高齢者では腎機能、肝機能などの生理機能が低下しているため、副作用があらわれやすいので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

6 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 出産予定日12週以内の妊婦には投与しないこと。[妊娠期間の延長、動脈管の早期閉鎖、子宮収縮の抑制、分娩時出血の増加につながるおそれがある。海外での大規模な疫学調査では、妊娠中のアスピリン服用と先天異常児出生の因果関係は否定的であるが、長期連用した場合は、母体の貧血、産前産後の出血、分娩時間の延長、難産、死産、新生児の体重減少・死亡などの危険が高くなるおそれをおそれないとの報告がある。また、ヒトで妊娠末期に投与された患者及びその新生児に出血異常があらわれたとの報告がある。さらに、妊娠末期のラットに投与した実験で、弱い胎児の動脈管収縮が報告されている]
- (2) 妊婦(ただし、出産予定日12週以内の妊婦は除く)又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[動物実験(ラット)で催奇形性作用があらわれたとの報告がある。妊娠期間の延長、過期産につながるおそれがある]
- (3) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。[母乳中へ移行することが報告されている]

7 小児等への投与

- (1) 低出生体重児、新生児又は乳児では、錠剤である本剤の嚥下が不能であることから、投与しないこと。
- (2) 小児には本剤の嚥下が可能なことを確認して、慎重に投与すること。
- (3) 小児等では、副作用があらわれやすいので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。腎障害またはその既往歴のある川崎病の患者ならびに低出生体重児の川崎病の患者に注意すること。川崎病の治療において肝機能障害⁴⁾の報告があるので適宜肝機能検査を行い、注意すること。〔重要な基本的注意〕の項参照)
- (4) 15歳未満の水痘、インフルエンザの患者に投与しないことを原則とするが、やむを得ず投与する場合には、慎重に投与し、投与後の患者の状態を十分に観察すること。〔重要な基本的注意〕の項参照)
- (5) 本剤投与中の15歳未満の川崎病の患者が水痘、インフルエンザを発症した場合には、投与を中断することを原則とするが、やむを得ず投与を継続する場合には、慎重に投与し、投与後の患者の状態を十分に観察すること。〔重要な基本的注意〕の項参照)

8 過量投与

- (1) 症状：悪心、嘔吐、口渇、下痢、頭痛、めまい、耳鳴、難聴、興奮、痙攣、過呼吸、昏睡などの症状を示す。酸塩基平衡異常と電解質異常が生じることがあり、発熱と脱水を併発する。過呼吸のとき呼吸性アルカローシスを生じ、すぐに代謝性アシドーシスが生じる。
- (2) 機序：肝臓のサリチル酸代謝能に限界があるため、サリチル酸の血中濃度が高くなるとクリアランスが減少し、半減期が増加する。
- (3) 処置：催吐、胃洗浄を行い、その上で活性炭や下剤を投与することも有用。ブドウ糖輸液などにより体液と電解質のバランスの維持を図る。小児の高熱には、スポンジ浴を行う。炭酸水素ナトリウムの静脈注射などによりアシドーシスを補正すると共に尿のアルカリ化を図る。重篤な場合、血液透析、腹腔灌流などを考慮する。

9 適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている)


10 その他の注意

- (1) in vitroの試験において、アスピリン等のグルクロン酸抱合により代謝される薬剤が抗ウイルス剤(ジドブジン)のグルクロン酸抱合を阻害したとの報告がある。⁵⁾
- (2) 非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期間投与されている女性において、一時的な不妊が認められたとの報告がある。

【薬物動態】

1 生物学的同等性試験⁶⁾

パッサミン配合錠A81と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(アスピリンとして81mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中アスピリン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。



薬物動態パラメータ

(平均±標準偏差, n=14)

	投与量 (mg)	AUC ₀₋₄ (μg·hr/mL)	Cmax (μg/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
パッサミン配合錠A81	81	1.25±0.27	1.39±0.21	0.37±0.12	0.599±0.159
標準製剤(錠剤, 81mg)	81	1.16±0.22	1.43±0.24	0.36±0.11	0.698±0.566

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

※2 溶出性²⁴⁾

本剤の溶出性は、日本薬局方外医薬品規格第3部に定められた規格に適合していることが確認されている。

【臨床成績】

主な学術雑誌に掲載された論文等の臨床成績は次のとおりである。

1 狭心症

(1) 慢性安定狭心症

スウェーデンで安定狭心症2,035名について、「プラセボ+ソタロール」を対照に「アスピリン(75mg/日)+ソタロール」の有効性が検討された結果、「心筋梗塞+突然死」が有意に減少した。⁷⁾

(2) 不安定狭心症

アメリカで不安定狭心症1,266名についてアスピリン(324mg/日)の有効性が検討された結果、「死亡+心筋梗塞」や非致死的心筋梗塞がアスピリン群で有意に抑制された。⁸⁾ スウェーデンで「不安定狭心症+non-Q心筋梗塞」796名についてアスピリン(75mg/日)の有効性が検討された結果、「死亡+心筋梗塞」が有意に抑制された。⁹⁾ 出血性の副作用はまれで軽度であったが、消化管障害は3ヵ月後に増加した。

2 心筋梗塞

(1) 心筋梗塞の再発防止

抗血小板薬の無作為化比較臨床試験のメタアナリシスは、アスピリンに代表される抗血小板薬が、高リスク患者の脳卒中、心筋梗塞及び血管死(以下、血管事故という)発生リスクを有意に減少することを示した。アスピリンの至適用量は75~325mg/日であった。¹⁰⁾ 国内の急性心筋梗塞の患者723名を対象とした無作為化比較臨床試験では、心筋梗塞の再発がアスピリン81mg/日群で有意に抑制された。アスピリンの副作用は、消化管の不快感4例、消化管出血1例及び出血異常2例であった。¹¹⁾

(2) 急性心筋梗塞

急性心筋梗塞の17,187名を対象として、イギリスで実施された無作為化比較臨床試験(ISIS-2)では、アスピリン(162.5mg/日)を5週間投与した結果、アスピリン群の血管死、非致死的心筋梗塞及び非致死の脳梗塞が有意に減少した。¹²⁾

3 虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞)

TIAあるいは軽度の虚血性脳卒中の患者1,360例について低用量のアスピリン(75mg/日)の有効性を検討したスウェーデンの大規模臨床試験(SALT)の結果、「脳卒中+死亡」は有意に減少し、脳卒中、TIA、心筋梗塞の発症も減少した。¹³⁾ 消化管出血の副作用はアスピリン群で有意に多かった。また、抗血小板薬の無作為化比較臨床試験のメタアナリシスは、アスピリンに代表される抗血小板薬が、高リスク患者の血管事故発生のリスクを有意に減少することを示した。アスピリンの至適用量は75~325mg/日であった。¹⁰⁾

- 4 冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後における血栓・塞栓形成の抑制
抗血小板薬の無作為比較臨床試験のメタアナリシスは、アスピリンに代表される抗血小板薬がPTCA、CABGなどの心血管術後の血管事故発生リスクを有意に減少することを示した。¹⁰⁾¹⁴⁾
- 5 健康人に対する一次予防を目的とした抗血小板療法有効性は確立されていない。
- 6 川崎病
川崎病患者306例を対象として、川崎病の急性期治療に対するアスピリン療法(50mg/kg、分2)、フルルビプロフェン療法及びプレドニゾン+ジビリダモール療法の間で、冠動脈異常所見出現頻度を比較したプロスペクティブ研究の結果、30病日、60病日のいずれの時点でもアスピリン療法が他の療法より優れていた。¹⁵⁾ 副作用による投与中止は肝機能障害6例、汎血球減少症1例があった。さらに、60病日の時点で冠動脈後遺症を残していた症例を対象とした発病後1年及び2年の追跡調査成績でも、アスピリン群が他の2群に対して成績が優れる傾向にあった。¹⁶⁾

【薬効薬理】

1 血小板凝集抑制作用


低用量アスピリンの経口投与は、虚血性脳疾患患者¹⁷⁾、虚血性心疾患患者¹⁸⁾及び川崎病患者¹⁹⁾においてADP、コラーゲン等による血小板凝集を抑制する。高用量のアスピリンは、解熱、鎮痛、抗炎症作用を示す。²⁰⁾

(1) 作用機序

アスピリンは、そのアセチル基によって血小板シクロオキシゲナーゼを不可逆的に阻害して血小板のトロンボキサンA₂(TXA₂)の産生を抑制することにより、血小板凝集を抑制し血小板血栓の形成を阻止する。²⁰⁾ 一方、アスピリンの主代謝物であるサリチル酸は、抗炎症効果はアスピリンと同程度の効力を示すものの、血小板凝集抑制作用は示さない。²¹⁾ アスピリンは、血管内皮細胞のシクロオキシゲナーゼも阻害してプロスタサイクリン(PGI₂)の生成も抑制し、その結果、血小板凝集抑制作用が減弱される可能性が指摘されてきた(アスピリンジレンマ)。そのため低用量アスピリン(75~325mg/日)の経口投与が推奨されている。

(2) 作用持続時間

アスピリンの経口投与後、アスピリンの血中濃度半減期は短いにもかかわらず、TXA₂産生抑制作用や血小板凝集抑制作用は血小板の寿命期間(7~10日)継続する。これは、アスピリンのアセチル基によるシクロオキシゲナーゼ阻害作用は不可逆的であり、かつ血小板はシクロオキシゲナーゼの合成能を有しないためと考えられている。²⁰⁾



日本人の健康成人男子にアスピリン・ダイアルミニウム配合剤1錠(アスピリンとして81mg)を経口投与した場合のコラーゲン1μg/mL刺激による血小板凝集に対する抑制率の経日変化²²⁾
(平均±標準偏差, n=8)

2 川崎病


川崎病の急性期において、アスピリンは高用量投与による抗炎症作用²⁰⁾により血管や心筋の炎症を抑えて心血管後遺症の発生を抑制するとともに、発熱などの臨床症状を改善することを目的として使用される。そして、解熱後から慢性期においては、低用量投与による血小板凝集抑制作用により血栓形成を抑制することを目的として使用される。²⁾

【有効成分に関する理化学的知見】

●アスピリン

一般名：アスピリン(Aspirin)
化学名：2-acetoxybenzoic acid
分子式：C₉H₈O₄
分子量：180.16
融点：約136℃(あらかじめ溶液を130℃に加熱しておく)
性状：アスピリンは白色の結晶、粒又は粉末で、においはなく、わずかに酸味がある。エタノール(95)又はアセトンに溶けやすく、ジエチルエーテルにやや溶けやすく、水に溶けにくい。水酸化ナトリウム試液又は炭酸ナトリウム試液に溶ける。湿った空气中で徐々に加水分解してサリチル酸及び酢酸になる。

構造式：



●炭酸マグネシウム

一般名：炭酸マグネシウム(Magnesium carbonate)
化学名：magnesium carbonate
分子式：MgCO₃
分子量：84.30

性状：炭酸マグネシウムは白色のもろい塊又は粉末で、においはない。水、エタノール(95)、1-プロパノール又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。希塩酸に泡立って溶ける。飽和水溶液はアルカリ性である。


●ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテート

一般名：ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテート
(Dihydroxyaluminum aminoacetate)

化学名：dihydroxyaluminum aminoacetate
分子式：C₂H₆AlNO₄・xH₂O
分子量：135.06(無水物)

性状：ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテートは白色の粉末又は粒で、においはなく、味はわずかに甘い。水又はエタノール(95)にほとんど溶けない。希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に大部分溶ける。

構造式：



【取扱い上の注意】

- 本品は吸湿により分解されるので、PTP包装のまま患者に交付すること。
- 長期保存に際しては、100錠包装アルミ袋を開封せずに保存すること。
- 安定性試験結果の概要²³⁾
最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、バッサミン配合錠A81は通常の市場流通下において安定であることが推測された。

【包装】

バッサミン配合錠A81

PTP包装：100錠(10錠×10)、1,200錠(10錠×120)

【主要文献】

- ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With Acute Myocardial Infarction : J.Am.Coll.Cardiol., **28**(5) 1328, 1996
- 日本小児循環器学会, 川崎病急性期治療のガイドライン, 2003
- 日本循環器学会・日本心臓病学会・日本小児科学会・日本小児循環器学会・日本胸部外科学会合同研究班, 川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン : Circulation Journal, 67 Suppl.IV, 1111, 2003
- 赤木等 : 総合臨床, **44**(10), 2410, 1995
- Sim.S.M. et al : Br.J.Clin.Pharmac., **32**, 17, 1991
- 大洋薬品工業株式会社内資料(生物学的同等性試験)
- SAPAT : Lancet, **340**, Dec.12, 1421, 1992
- Lewis.H.D. et al : N.Engl.J.Med., **309**(7), 396, 1983
- The RISC Group : Lancet, **336**, Oct.6, 827, 1990
- Antiplatelet Trialists' Collaboration : Br.Med.J., **308**, 81, 1994
- Yasue.H. et al : Am.J.Cardiol., **83**, 1308, 1999
- ISIS-2 Collaborative Group : Lancet, Aug.13, 349, 1988
- The SALT Cooperative Group : ibid., **338**, Nov.30, 1345, 1991
- Antiplatelet Trialists' Collaboration : Br.Med.J., **308**, 159, 1994
- 草川等 : 日本小児科学会雑誌, **87**(12), 2486, 1983
- 浅井等 : 小児科, **26**(9), 995, 1985
- Tohgi.H. et al : Stroke, **23**, 1400, 1992
- 谷口等 : 日本老年医学会誌, **18**(6), 463, 1981
- 白幡等 : 日本小児科学会雑誌, **89**(10), 2207, 1985
- 高折等監訳 : グッドマン・ギルマン薬理書, 第9版, p825~882・p1789~1790, 廣川書店, 1999
- 鶴見等 : 炎症, **11**(1), 33, 1991
- 星等 : 臨床薬理, **32**, 223, 2001
- 大洋薬品工業株式会社内資料(安定性試験)
- ※24) 大洋薬品工業株式会社内資料(溶出試験)

※【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。
大洋薬品工業株式会社 タイヨーDIセンター
〒453-0801 名古屋市中村区太閤一丁目24番11号
TEL 0120-080-601 FAX 052-459-2853

※製造販売元

 大洋薬品工業株式会社
名古屋市中村区太閤一丁目24番11号