

**フロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「タイヨー」
を正しく服用するために**

<保護者の方へのお願い>

**大切な注意ですので、
必ずお読みください。**



- ◆ このお薬には、気管支を広げることで、呼吸を楽にする働きがあります。
- ◆ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。次に飲む時間が近い場合は、飲み忘れた分は飲まないで1回分を飛ばし、次に飲む時間に1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- ◆ 誤って多く飲んだ場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。
このお薬を大量に服用すると、脈が早くなったり、動悸がするなどの副作用が現れることがあります。
- ◆ お子さんの届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
薬が残った場合は、保管しないで廃棄してください。

★医療機関名★



**フロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「タイヨー」
を正しく服用するために**

<保護者の方へのお願い>

**大切な注意ですので、
必ずお読みください。**



- ◆ このお薬には、気管支を広げることで、呼吸を楽にする働きがあります。
- ◆ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。次に飲む時間が近い場合は、飲み忘れた分は飲まないで1回分を飛ばし、次に飲む時間に1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- ◆ 誤って多く飲んだ場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。
このお薬を大量に服用すると、脈が早くなったり、動悸がするなどの副作用が現れることがあります。
- ◆ お子さんの届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
薬が残った場合は、保管しないで廃棄してください。

★医療機関名★



**フロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「タイヨー」
を正しく服用するために**

<保護者の方へのお願い>

**大切な注意ですので、
必ずお読みください。**



- ◆ このお薬には、気管支を広げることで、呼吸を楽にする働きがあります。
- ◆ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。次に飲む時間が近い場合は、飲み忘れた分は飲まないで1回分を飛ばし、次に飲む時間に1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- ◆ 誤って多く飲んだ場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。
このお薬を大量に服用すると、脈が早くなったり、動悸がするなどの副作用が現れることがあります。
- ◆ お子さんの届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
薬が残った場合は、保管しないで廃棄してください。

★医療機関名★



**フロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「タイヨー」
を正しく服用するために**

<保護者の方へのお願い>

**大切な注意ですので、
必ずお読みください。**



- ◆ このお薬には、気管支を広げることで、呼吸を楽にする働きがあります。
- ◆ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。次に飲む時間が近い場合は、飲み忘れた分は飲まないで1回分を飛ばし、次に飲む時間に1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- ◆ 誤って多く飲んだ場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。
このお薬を大量に服用すると、脈が早くなったり、動悸がするなどの副作用が現れることがあります。
- ◆ お子さんの届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
薬が残った場合は、保管しないで廃棄してください。

★医療機関名★

