

**安定性試験 ー粉砕後の安定性試験ー**

高尿酸血症治療剤 (アロプリノール錠)

**プロデック錠 100mg****試験条件**

検体	保存条件			包装形態
プロデック錠 100mg 粉砕品	湿度	25±1°C・75±5%RH	4週間	遮光・開放

**試験結果**

保存条件	外観	含量 残存率 <sup>注1)</sup> (%)	評価 <sup>注2)</sup>
開始時 (粉砕直後)	白色のフィルム片を含む白色の粉末であった	100	—
25°C・75%RH 4週間	白色のフィルム片を含む白色の粉末で、 一部塊があった <sup>注3)</sup>	98.1	○

注1) 試験開始時を100とした

[n=3]

注2) ◎:すべての測定項目において変化を認めなかった、○:いずれかの試験項目で規格内の変化を認めた<sup>1)</sup>

注3) 塊は軽く押すことで容易に粉末となった

本製剤の粉砕品は、湿度が高い場合に凝集する傾向がある。粉砕後は湿度に留意することが望ましい。

なお、本製剤を粉砕して投与した場合の有効性および薬物体内動態の検討は実施していない。また、上記データは本製剤の分割・粉砕を推奨するものではない。

**参考文献**

1) 西岡 豊 他, “錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性情報(改訂 5 版)”, (株) 医薬ジャーナル社, 大阪, 2007, pp. 7-11.

## &lt;評価基準&gt;

判定	変化なし	変化あり(規格内)	変化あり(規格外)
外観	外観上の変化をほとんど認めない	色調:わずかな変化(退色等)等を認めるが規格内 その他:品質上問題とならない程度の変化である	規格外の色調変化およびその他性状に著しい変化を認める
含量 <sup>1)</sup>	残存率低下が3%未満	残存率低下が3%以上で、規格内	規格外