

保護者の方へ

## メキタジン小児用シロップ 0.03% 「タイヨー」の取り扱い上の注意

このお薬は日光のあたる所など明るい場所に放置するとピンクに変色するので、出来るかぎり光にあてないように注意してください。特に持ち運び時に注意してください。

このお薬は衛生的に取り扱ってください。  
保存は必ず冷蔵庫で行ってください。  
お薬に異常（変色など）があったときは飲ませないでください。  
このお薬は他のお薬と混ぜないでください。  
このお薬は先生の指示を守って飲ませてください。  
指示された期間内に飲みきらない場合、残りのお薬は廃棄してください。

お子さまが誤って飲むことのないよう、  
保管にご注意ください。

わからないことがありましたら、医師または薬剤師  
におたずねください。

病院・薬局名

保護者の方へ

## メキタジン小児用シロップ 0.03% 「タイヨー」の取り扱い上の注意

このお薬は日光のあたる所など明るい場所に放置するとピンクに変色するので、出来るかぎり光にあてないように注意してください。特に持ち運び時に注意してください。

このお薬は衛生的に取り扱ってください。  
保存は必ず冷蔵庫で行ってください。  
お薬に異常（変色など）があったときは飲ませないでください。  
このお薬は他のお薬と混ぜないでください。  
このお薬は先生の指示を守って飲ませてください。  
指示された期間内に飲みきらない場合、残りのお薬は廃棄してください。

お子さまが誤って飲むことのないよう、  
保管にご注意ください。

わからないことがありましたら、医師または薬剤師  
におたずねください。

病院・薬局名

保護者の方へ

## メキタジン小児用シロップ 0.03% 「タイヨー」の取り扱い上の注意

このお薬は日光のあたる所など明るい場所に放置するとピンクに変色するので、出来るかぎり光にあてないように注意してください。特に持ち運び時に注意してください。

このお薬は衛生的に取り扱ってください。  
保存は必ず冷蔵庫で行ってください。  
お薬に異常（変色など）があったときは飲ませないでください。  
このお薬は他のお薬と混ぜないでください。  
このお薬は先生の指示を守って飲ませてください。  
指示された期間内に飲みきらない場合、残りのお薬は廃棄してください。

お子さまが誤って飲むことのないよう、  
保管にご注意ください。

わからないことがありましたら、医師または薬剤師  
におたずねください。

病院・薬局名

保護者の方へ

## メキタジン小児用シロップ 0.03% 「タイヨー」の取り扱い上の注意

このお薬は日光のあたる所など明るい場所に放置するとピンクに変色するので、出来るかぎり光にあてないように注意してください。特に持ち運び時に注意してください。

このお薬は衛生的に取り扱ってください。  
保存は必ず冷蔵庫で行ってください。  
お薬に異常（変色など）があったときは飲ませないでください。  
このお薬は他のお薬と混ぜないでください。  
このお薬は先生の指示を守って飲ませてください。  
指示された期間内に飲みきらない場合、残りのお薬は廃棄してください。

お子さまが誤って飲むことのないよう、  
保管にご注意ください。

わからないことがありましたら、医師または薬剤師  
におたずねください。

病院・薬局名