

ムコロン[®]シロップ5%

- 【組成】 1mL中：L-カルボシステイン・・・50mg
 【性状】 特異な芳香及び甘味を有する褐色のシロップ剤(レモン風味)
 【用法・用量】 通常、幼・小児に、体重kg当り、カルボシステインとして1日30mg（本剤0.6mL）を3回に分割して経口投与する。
 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

÷3

年齢 目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量		1日投与量	
		シロップ (mL)	カルボシステイン (mg)	シロップ (mL)	カルボシステイン (mg)
1ヶ月	4	0.8	40.0	2.4	120.0
	5	1.0	50.0	3.0	150.0
3ヶ月	6	1.2	60.0	3.6	180.0
	7	1.4	70.0	4.2	210.0
6ヶ月	8	1.6	80.0	4.8	240.0
	9	1.8	90.0	5.4	270.0
1	10	2.0	100.0	6.0	300.0
	11	2.2	110.0	6.6	330.0
2	12	2.4	120.0	7.2	360.0
	13	2.6	130.0	7.8	390.0
3	14	2.8	140.0	8.4	420.0
	15	3.0	150.0	9.0	450.0
4	16	3.2	160.0	9.6	480.0
	17	3.4	170.0	10.2	510.0
5	18	3.6	180.0	10.8	540.0
	19	3.8	190.0	11.4	570.0
6	20	4.0	200.0	12.0	600.0
	21	4.2	210.0	12.6	630.0
7	22	4.4	220.0	13.2	660.0
	23	4.6	230.0	13.8	690.0
8	24	4.8	240.0	14.4	720.0
	25	5.0	250.0	15.0	750.0
9	26	5.2	260.0	15.6	780.0
	27	5.4	270.0	16.2	810.0
10	28	5.6	280.0	16.8	840.0
	29	5.8	290.0	17.4	870.0
9	30	6.0	300.0	18.0	900.0
	31	6.2	310.0	18.6	930.0
10	32	6.4	320.0	19.2	960.0
	33	6.6	330.0	19.8	990.0
10	34	6.8	340.0	20.4	1020.0