

# ヘリコバクター・ピロリ除菌療法 を受けられる患者さんへ



胃潰瘍や十二指腸潰瘍が再発する原因の一つである、ヘリコバクター・ピロリ菌を取り除く治療を「ヘリコバクター・ピロリ除菌療法」と言います。

◇1回分として、2種類の抗菌剤と胃酸分泌抑制剤の合計3種類の薬を同時に服用してください。

◇1日2回(朝夕)、7日間続けて服用してください。

3種類の薬を正しく飲み続けることが重要です。  
自分の判断で飲むのを止めたり、薬を減らしたりしないでください。  
また、除菌治療の間は、アルコールの摂取(飲酒)を避けてください。

## ●服用中は、以下の点にご注意ください●

これらの薬を服用すると、以下の消化器症状や味覚異常の現れる場合があります。症状に応じて次のようにしてください。

### <軟便、軽い下痢または味覚異常の場合>

自分の判断で薬を飲む量や回数を減らしたりせず、7日分の薬を最後まで飲みきってください。  
ただし、飲み続けているうちに下痢、味覚異常がひどくなった場合は、医師または薬剤師に相談してください。

### <発熱、腹痛を伴う下痢、あるいは下痢に粘液や血液が混ざっている場合>

直ちに薬を飲むことを中止し、医師または薬剤師に連絡してください。

# ヘリコバクター・ピロリ除菌療法 を受けられる患者さんへ



胃潰瘍や十二指腸潰瘍が再発する原因の一つである、ヘリコバクター・ピロリ菌を取り除く治療を「ヘリコバクター・ピロリ除菌療法」と言います。

◇1回分として、2種類の抗菌剤と胃酸分泌抑制剤の合計3種類の薬を同時に服用してください。

◇1日2回(朝夕)、7日間続けて服用してください。

3種類の薬を正しく飲み続けることが重要です。  
自分の判断で飲むのを止めたり、薬を減らしたりしないでください。  
また、除菌治療の間は、アルコールの摂取(飲酒)を避けてください。

## ●服用中は、以下の点にご注意ください●

これらの薬を服用すると、以下の消化器症状や味覚異常の現れる場合があります。症状に応じて次のようにしてください。

### <軟便、軽い下痢または味覚異常の場合>

自分の判断で薬を飲む量や回数を減らしたりせず、7日分の薬を最後まで飲みきってください。  
ただし、飲み続けているうちに下痢、味覚異常がひどくなった場合は、医師または薬剤師に相談してください。

### <発熱、腹痛を伴う下痢、あるいは下痢に粘液や血液が混ざっている場合>

直ちに薬を飲むことを中止し、医師または薬剤師に連絡してください。

## ◆ ヘリコクター・ピロリ除菌療法って？

胃潰瘍や十二指腸潰瘍が再発する原因のひとつに、胃内に存在する細菌であるヘリコクター・ピロリが関係することが明らかになっています。2種類の抗菌薬と1種類の胃酸の分泌を抑える薬を服用することにより、この細菌を取り除く治療を「ヘリコクター・ピロリ除菌療法」と言います。

## ◆ ピロリ菌を除菌するメリットはなに？

ヘリコクター・ピロリの除菌に成功すると、胃潰瘍や十二指腸潰瘍が再発しにくくなることが分かっています。



気になる点がありましたら、医師または薬剤師に相談してください。

## ◆ ヘリコクター・ピロリ除菌療法って？

胃潰瘍や十二指腸潰瘍が再発する原因のひとつに、胃内に存在する細菌であるヘリコクター・ピロリが関係することが明らかになっています。2種類の抗菌薬と1種類の胃酸の分泌を抑える薬を服用することにより、この細菌を取り除く治療を「ヘリコクター・ピロリ除菌療法」と言います。

## ◆ ピロリ菌を除菌するメリットはなに？

ヘリコクター・ピロリの除菌に成功すると、胃潰瘍や十二指腸潰瘍が再発しにくくなることが分かっています。



気になる点がありましたら、医師または薬剤師に相談してください。