

ロペラミド塩酸塩 細粒小児用0.05%「タイヨー」

<換算表> 投与量は細粒としての量(g)を示す

年齢目安(才)	体重(kg)	1回投与量(g)		1日投与量(g)
		1日2回の場合	1日3回の場合	
6ヶ月	8	0.16~0.32	0.11~0.21	0.32~0.64
	9	0.18~0.36	0.12~0.24	0.36~0.72
1	10	0.20~0.40	0.13~0.27	0.40~0.80
	11	0.22~0.44	0.15~0.29	0.44~0.88
2	12	0.24~0.48	0.16~0.32	0.48~0.96
	13	0.26~0.52	0.17~0.35	0.52~1.04
3	14	0.28~0.56	0.19~0.37	0.56~1.12
	15	0.30~0.60	0.20~0.40	0.60~1.20
4	16	0.32~0.64	0.21~0.43	0.64~1.28
	17	0.34~0.68	0.23~0.45	0.68~1.36
5	18	0.36~0.72	0.24~0.48	0.72~1.44
	19	0.38~0.76	0.25~0.51	0.76~1.52
6	20	0.40~0.80	0.27~0.53	0.80~1.60
	21	0.42~0.84	0.28~0.56	0.84~1.68
7	22	0.44~0.88	0.29~0.59	0.88~1.76
	23	0.46~0.92	0.31~0.61	0.92~1.84
8	24	0.48~0.96	0.32~0.64	0.96~1.92
	25	0.50~1.00	0.33~0.67	1.00~2.00
9	26	0.52~1.04	0.35~0.69	1.04~2.08
	27	0.54~1.08	0.36~0.72	1.08~2.16
10	28	0.56~1.12	0.37~0.75	1.12~2.24
	29	0.58~1.16	0.39~0.77	1.16~2.32

年齢目安(才)	体重(kg)	1回投与量(g)		1日投与量(g)
		1日2回の場合	1日3回の場合	
9	30	0.60~1.20	0.40~0.80	1.20~2.40
	31	0.62~1.24	0.41~0.83	1.24~2.48
10	32	0.64~1.28	0.43~0.85	1.28~2.56
	33	0.66~1.32	0.44~0.88	1.32~2.64
11	34	0.68~1.36	0.45~0.91	1.36~2.72
	35	0.70~1.40	0.47~0.93	1.40~2.80
12	36	0.72~1.44	0.48~0.96	1.44~2.88
	37	0.74~1.48	0.49~0.99	1.48~2.96
13	38	0.76~1.52	0.51~1.01	1.52~3.04
	39	0.78~1.56	0.52~1.04	1.56~3.12
14	40	0.80~1.60	0.53~1.07	1.60~3.20
	41	0.82~1.64	0.55~1.09	1.64~3.28
15	42	0.84~1.68	0.56~1.12	1.68~3.36
	43	0.86~1.72	0.57~1.15	1.72~3.44
16	44	0.88~1.76	0.59~1.17	1.76~3.52
	45	0.90~1.80	0.60~1.20	1.80~3.60
17	46	0.92~1.84	0.61~1.23	1.84~3.68
	47	0.94~1.88	0.63~1.25	1.88~3.76
18	48	0.96~1.92	0.64~1.28	1.92~3.84
	49	0.98~1.96	0.65~1.31	1.96~3.92
19	50	1.00~2.00	0.67~1.33	2.00~4.00

※成人用製剤(カプセル剤)の用法用量

塩酸ロペラミドとして、通常、成人に1日1~2mgを1~2回に分割経口投与する。

なお、症状により適宜増減する。

<成分分量> 1g中: 塩酸ロペラミド 0.5mg
 <性状> わずかに特異なにおいを有し、味は初め甘く、後にわずかに苦い、うすいだい色の細粒剤
 <効能効果> 急性下痢症
 <用法用量> 塩酸ロペラミドとして、通常、小児に1日0.02~0.04mg/kg(本剤0.04~0.08g/kg)を2~3回に分割経口投与する。
 なお、症状により適宜増減する。