

## 小児用量換算表

# リゾチーム塩酸塩シロップ0.5%「タイヨー」

〈成分分量〉 1mL中:リゾチーム塩酸塩 …5mg(力価)

〈性状〉 無臭で甘味を有する無色透明のシロップ剤

〈効能効果〉 ○痰の切れが悪く、喀出回数が多い下記疾患の喀痰喀出困難  
気管支炎、気管支喘息、気管支拡張症  
○次の疾患の腫脹の緩解  
慢性副鼻腔炎

〈用法用量〉 通常、下記の1日量を3回に分けて経口投与する。  
2才未満 : 3～6mL (リゾチーム塩酸塩として15～30mg(力価))  
2～6才 : 6～8mL (リゾチーム塩酸塩として30～40mg(力価))  
7～14才 : 8～12mL (リゾチーム塩酸塩として40～60mg(力価))  
なお、症状により適宜増減する。  
本剤の体内での作用機序はなお解明されない点も多く、また、用量・効果の関係も必ずしも明らかにされていない。したがって漫然と投与すべきではない。

〈参考〉

投与量はシロップとしての量(mL)を示す

年齢	1回投与量(mL)	1日投与量(mL)
2才未満	1～2	3～6
2～6才	2～2.7	6～8
7～14才	2.7～4	8～12



テバ製薬DIセンター  
TEL: 0120-923-093  
FAX: 052-459-2853