

## 同種品と適応が異なる製品一覧

製品名	同種品名	同種品のみの効能・効果
アシビル内服ゼリー800mg	剤形・規格違い：ゾピラックス錠400	<p>[成人・小児] 単純疱疹 造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制</p> <p>[小児のみ] 性器ヘルペスの再発抑制</p>
アセトアミノフェン細粒20% (TYK) アセトアミノフェン錠200mg (TYK)	カロナール細粒20% カロナール錠200	変形性関節症の疾患並びに症状の鎮痛 1回最大投与量1000mg及び1日最大投与量4000mg
アテノート錠10	アーチスト錠10mg	虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全 (アンジオテンシン変換酵素阻害薬、利尿薬、ジギタリス製剤等の基礎治療を受けている患者)
アルギスタットカプセル75	アルタットカプセル75	小児への投与
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg/5mg「タイヨー」 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg/5mg「TYK」	タナトリアル錠2.5/5	1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症
オブチラン錠10 $\mu$ g	規格違い：オパルモン錠5 $\mu$ g 規格違い：プロレナル錠5 $\mu$ g	後天性の腰部脊柱管狭窄症に伴う自覚症状および歩行能力の改善
ガルトバン注射液10mg	規格違い：スロンノンHI注10mg/2mL 規格違い：ノバスタンHI注10mg/2mL	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）II型患者における血液体外循環時の灌流血液の凝固防止</li> <li>・ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）II型（発症リスクのある場合を含む）における経皮的冠インターベンション施行時の血液の凝固防止</li> <li>・ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）II型における血栓症の発症抑制</li> </ul>
ガルトバン注射液10mgシリンジ	剤形・規格違い：スロンノンHI注10mg/2mL 剤形・規格違い：ノバスタンHI注10mg/2mL	
グラニセトン点滴静注液3mgバッグ「タイヨー」	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	放射線照射に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）
スクリット配合内用剤	ニフレック配合内用剤	バリウム注腸X線造影検査
セチリジン塩酸塩錠5mg「タイヨー」 セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」	ジルテック錠5	小児への投与
タイプロンカプセル15 タビゾールカプセル15	タケブロンカプセル15	低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制
テクトロール散	マグコロールP	等張液投与
ドネペジル塩酸塩錠3mg/5mg「タイヨー」 ドネペジル塩酸塩錠3mg/5mg「興和テバ」	アリセプト錠3mg/5mg	高度のアルツハイマー型認知症症状の進行抑制

製品名	同種品名	同種品のみの効能・効果
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg/5mg「タイヨー」 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg/5mg「興和テバ」	アリセプトD錠3mg/5mg	高度のアルツハイマー型認知症症状の進行抑制
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	バンコマイシンに感性的ペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）感染症
برانلكاستドライシロップ10%「タイヨー」 برانلكاستDS10%「TYK」	オノンドライシロップ10%	アレルギー性鼻炎
プリンク注5μg/10μg	パルクス注5μg/10μg リブル注5μg/10μg	経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善
フルカード静注液100mg/200mg	剤形違い： ジフルカン静注液100mg/200mg	・造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防 ・小児、新生児への投与
プレロン錠1mg/2.5mg/5mg	プレドニゾン錠1mg（旭化成） プレドハン錠2.5mg プレドニン錠5mg	多発性骨髄腫
ボグリボース錠0.2mg「タイヨー」 ベグリラート錠0.2mg	ハイスン錠0.2	耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制（ただし、食事療法・運動療法を十分に行っても改善されない場合に限る）
ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」 ベグリラートOD錠0.2mg	ハイスンOD錠0.2	耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制（ただし、食事療法・運動療法を十分に行っても改善されない場合に限る）
メロペナム点滴静注用0.25g/0.5g「タイヨー」	メロペン点滴用バイアル0.25g/0.5g	・発熱性好中球減少症 ・一般感染症における1日3g（カ皿）までの投与
ラベプラゾールNa錠10mg「興和テバ」 ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」	バリエット錠10mg	ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	タケブロンOD錠15	低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制

製品名	同種品名	同種品にない効能・効果
チャルドール錠1mg	規格違い：ラキソベロン錠2.5mg	手術前における腸管内容物の排除

※効能・効果、用法・用量の詳細は、添付文書をご参照ください。